Instructions for Use: asmoflicon A (40% water) for 2 week or 1 month replacement contact lens

Important
- Read the following instructions carefully before use and keep this document in a safe place for future reference.
- If you have any questions about this document and those of your eye care professional or practitioner for appropriate use of contact lenses and lens care products including lens cases.

FOR 2 WEEK REPLACEMENT CONTACT LENS

Introduction
asmoflicon A (40% water) is a blue tinted soft silicone hydrogel contact lens with 40% water content.

The sterile asmoflicon A (40% water) is individually packaged in a foil-sealed plastic container and immersed in buffered saline solution.

Indications
asmoflicon A (40% water) is intended for daily or up to 7 days extended wear and daily disposable modality for the correction of visual acuity in aphakic and non-aphakic eyes.

Wearing restrictions
Clean and disinfect the contact lenses after lens removal using the cleaning and disinfecting regimen recommended by your eye care professional or practitioner.

Replace the contact lenses at least every 2 weeks.

Be sure to consult your eye care professional or practitioner for the lens wearing schedule based on your individual needs. Always dispose of the contact lenses after the instructed wearing period. Wearing the contact lenses beyond the instructed wearing period increases the risk of eye problems.

FOR MONATSLINSEN

Introduction
asmoflicon A (40% water) ist eine blau gefärbte weiche Silikon-Hydrogel-Kontaktlinse mit einem Wassergehalt von 40 %.

Die sterile asmoflicon A (40% water) ist einzeln in siegelfester Kunststoffverpackung gelagert und in gepufferter Kochsalzlösung gelagert.

Anwendungsgebiete
asmoflicon A (40% water) Kontaktlinsen sind für ein Tagestragen zur Korrektur der sehbaren Ametropie (Kurzsichtigkeit, Weitsichtigkeit und/oder Astigmatismus) und/oder Presbyopie in nicht-aphakischen Augen vorgesehen.

Einschränkungen beim Tragen
Reinigen und desinfizieren Sie die Kontaktlinsen nach dem Abnehmen gemäß der Reinigungs- und Desinfektionsvorschrift Ihres Augenarztes oder Optikers/Optometristen.

Ersetzen Sie die Kontaktlinsen alle 2 Wochen durch neue Linsen.

Beachten Sie unbedingt den Tragezeitplan Ihres Augenarztes oder Optikers/Optometristen, der auf Ihre individuellen Bedürfnisse abgestimmt ist. Entsorgen Sie die Kontaktlinsen nach der vorgeschriebenen Tragedauer. Das Tragen der Kontaktlinsen über die vorgeschriebene Tragedauer hinaus erhöht das Risiko von Augenproblemen.

FÖR MÅNADSLINSEN

Introduktion
asmoflicon A (40% vatten) är en blå tonad mjuk kontaktlins i silikonhydrogel med 40% vatteninnehåll.

Den sterila asmoflicon A (40% vatten) är förpackad i en individuell blisterförpackning av plast och nedsänkt i buffrad koksaltlösning.

Indikationer
asmoflicon A (40% vatten) är avsedd för daglig eller kort användning och för refraktiva ametropa (myopia, hypermetropia och/eller astigmatism) och/or presbyopia in non-aphakic diseased-free eyes.

Varning kontaktlinser
Rengör och desinficera kontaktlinserna efter att linsen har tagits ur ögat med den rengörings- och desinficeringsmetod som rekommenderas av din ögonläkare eller optiker.

Byt kontaktlinserna minst varannan vecka.

Se till att rådfråga din ögonläkare eller optiker för att få rekommendationer om hur länge kontaktlinserna ska användas, baserat på dina individuella behov. Kassera kontaktlinserna efter att de har använts under den rekommenderade tiden. Att använda linserna längre än den rekommenderade tiden ökar risken för ögonproblem.

Gebrauchsanweisung: asmoflicon A (40 % Wasser) 2-Wochenlinsen oder Monatslinsen

Wichtig
- Lesen Sie die folgende Gebrauchsanweisung aufmerksam und bewahren Sie sie für die zukünftige Bezugnahme auf.
- Wenden Sie sich bei Fragen zu diesem Dokument und die Ihres Augenarztes oder Optikers/Optometristen bezüglich der Kontaktlinsen sowie denen der Linsenpflegeprodukte einschließlich der Kontaktlinsenbehälter.

FÜR 2-WOCHENLINSEN

Einführung
asmoflicon A (40 % Wasser) ist eine blau gefärbte weiche Silikon-Hydrogel-Kontaktlinse mit einem Wassergehalt von 40 %.

Die sterile asmoflicon A (40 % Wasser) Kontaktlinse ist steril in einem mit geputfferter Kochsalzlösung gefüllten und versiegelten Kunststoffbehälter einzeln verpackt.

Indikationen
asmoflicon A (40 % Wasser) Kontaktlinsen sind für die tägliche oder bis zu 7 Tagen sein bis zu 7 Tage zur Korrektur der refraktiven Ametropie (Kurzsichtigkeit, Weitsichtigkeit und/oder Astigmatismus) und/oder Presbyopie in nicht-aphakischen Augen vorgesehen.

Einschränkungen beim Tragen
Reinigen und desinfizieren Sie die Kontaktlinsen nach dem Abnehmen gemäß der Reinigungs- und Desinfektionsvorschrift Ihres Augenarztes oder Optikers/Optometristen.

Ersetzen Sie die Kontaktlinsen alle 2 Wochen durch neue Linsen.

Beachten Sie unbedingt den Tragezeitplan Ihres Augenarztes oder Optikers/Optometristen, der auf Ihre individuellen Bedürfnisse abgestimmt ist. Entsorgen Sie die Kontaktlinsen nach der vorgeschriebenen Tragedauer. Das Tragen der Kontaktlinsen über die vorgeschriebene Tragedauer hinaus erhöht das Risiko von Augenproblemen.

FÜR MONATSLINSEN

Einführung
asmoflicon A (40 % Wasser) ist eine blau gefärbte weiche Silikon-Hydrogel-Kontaktlinse mit einem Wassergehalt von 40 %.

Die sterile asmoflicon A (40 % Wasser) Kontaktlinse ist steril in einem mit geputfferter Kochsalzlösung gefüllten und versiegelten Kunststoffbehälter einzeln verpackt.

Anwendungsgebiete
asmoflicon A (40 % Wasser) Kontaktlinsen sind für ein Tagestragen zur Korrektur der sehbaren Ametropie (Kurzsichtigkeit, Weitsichtigkeit und/oder Astigmatismus) und/oder Presbyopie in nicht-aphakischen Augen vorgesehen.

Einschränkungen beim Tragen
Reinigen und desinfizieren Sie die Kontaktlinsen nach dem Abnehmen gemäß der Reinigungs- und Desinfektionsvorschrift Ihres Augenarztes oder Optikers/Optometristen.

Ersetzen Sie die Kontaktlinsen alle 4 Wochen durch neue Linsen.

Beachten Sie unbedingt den Tragezeitplan Ihres Augenarztes oder Optikers/Optometristen, der auf Ihre individuellen Bedürfnisse abgestimmt ist. Entsorgen Sie die Kontaktlinsen nach der vorgeschriebenen Tragedauer. Das Tragen der Kontaktlinsen über die vorgeschriebene Tragedauer hinaus erhöht das Risiko von Augenproblemen.

GEBRAUCHSANWEISUNG

Tragen Sie die Kontaktlinsen nicht, wenn eine der folgenden Bedingungen vorliegt:
- Akute oder subakute Infektionen des Auges, des Augenlids oder des Umfeldes
- Krankheiten, Verletzungen oder Anomalien mit Auswirkung auf die Hornhaut, Bindehaut oder Augenlider
- Schwere Trockenheit des Auges
- Hornhaut-Progressionen (wie Keratokonus)
- Wiederkehrende Hornhautentzündungen
- Hornhautverletzungen durch Fremdkörper
- Allergische Reaktionen, die durch das Tragen von Kontaktlinsen hervorgerufen oder verschlimmert werden können
- Bestehende Hornhautkrümmen
- Schwere Augentrockenheit
- Unvollständig ausgeheilte Hornhaut nach Augenoperationen

WARNHINWEISE

Nehmen Sie Ihre Kontaktlinsen sofort heraus, wenn Sie Rötungen Ihrer Augen feststellen. Sprechen Sie Ihren Augenarzt oder Optiker/Optometristen über die Verschreibung eines Kontaktlinsenpflegemittels, wenn Sie Irritationen mit Ihren Linsen haben.

Wenn Sie nach Behandlung Ihrer Augenprobleme Ihre Kontaktlinsen wieder tragen möchten, sprechen Sie mit Ihrem Augenarzt oder Optiker/Optometristen über die Verschreibung eines Kontaktlinsenpflegemittels, wenn Sie Irritationen mit Ihren Linsen haben.

Wenn Sie nach Behandlung Ihrer Augenprobleme Ihre Kontaktlinsen wieder tragen möchten, sprechen Sie mit Ihrem Augenarzt oder Optiker/Optometristen über die Verschreibung eines Kontaktlinsenpflegemittels, wenn Sie Irritationen mit Ihren Linsen haben.

GEGENANZEIGEN

Tragen Sie die Kontaktlinsen nicht, wenn eine der folgenden Bedingungen vorliegt:
- Akute oder subakute Infektionen des Auges, des Augenlids oder des Umfeldes
- Krankheiten, Verletzungen oder Anomalien mit Auswirkung auf die Hornhaut, Bindehaut oder Augenlider
- Schwere Trockenheit des Auges
- Hornhaut-Progressionen (wie Keratokonus)
- Wiederkehrende Hornhautentzündungen
- Hornhautverletzungen durch Fremdkörper
- Allergische Reaktionen, die durch das Tragen von Kontaktlinsen hervorgerufen oder verschlimmert werden können
- Bestehende Hornhautkrümmen
- Schwere Augentrockenheit
- Unvollständig ausgeheilte Hornhaut nach Augenoperationen

WARNHINWEISE

Nehmen Sie Ihre Kontaktlinsen sofort heraus, wenn Sie Rötungen Ihrer Augen feststellen. Sprechen Sie Ihren Augenarzt oder Optiker/Optometristen über die Verschreibung eines Kontaktlinsenpflegemittels, wenn Sie Irritationen mit Ihren Linsen haben.

Wenn Sie nach Behandlung Ihrer Augenprobleme Ihre Kontaktlinsen wieder tragen möchten, sprechen Sie mit Ihrem Augenarzt oder Optiker/Optometristen über die Verschreibung eines Kontaktlinsenpflegemittels, wenn Sie Irritationen mit Ihren Linsen haben.

**GEBRAUCHSANWEISUNG

Notkunarleiðbeiningar: asmofilcon A (40% vatn) í 2 vikur eða 1 mánaðarnotkunar

Mikilvægt
- Lestu eftirfarandi leiðbeiningar vandlega fyrir notkun og geymdu til síðari nota.
- **Fylgið alltaf leiðbeiningum á þessu blaði og fyrir sugnalæsi eða sótthreinsandi fyrir linsur/ráðgjöf notkun augnlinsu og augnsjúkdómsfræðings þ.m.t. linsubúnað.**

FYRIR 2 VIKNA AUGNLINSUR
Ætlunargur
Asmofilcon A (40% vatn) er lítið magn augnlinsur er ljóst hár að mælum. Hyrsýni augnlinsa er ætlað til dagleg notkur til að leiðrétta sjónskerðingu hjá einstaklingum sem eru með augnlægir og ári augnsjúkdóma.
Takmarkanir á notkun
Hreinsaðu og sótthreinsaðu augnlinsurnar eftir að þú tekur hana úr í samræmi við hreinsunar- og sótthreinsunarferli sem lýst er í augnlinsuna. Skoðið augnlinsuna á hverjum degi. Skoðið ef augnlinsurnar á hverjum degi. Skoðið ef augnlinsurnar á hverjum degi. Skoðið ef augnlinsurnar